

BIJOUX — MATIÈRES AUTORISÉES ET À ÉVITER

AUTORISÉES

- Titane implant grade 23
ASTM F136 - hypoallergénique
- Or 14k ou 18k massif
Sans alliage nickel
- Or blanc 14k ou 18k
Massif, sans nickel
- Niobium
Inerte, hypoallergénique
- Verre borosilicate
100% inerte

À ÉVITER


- ~~Acier chirurgical 316L~~
Contient du nickel
- ~~Acier PVD / plaqué or~~
Revêtement qui s'écaille
- ~~Argent~~
S'oxyde dans la plaie
- ~~Plastique / acrylique~~
Poreux, non stérilisable
- ~~Acier fantaisie / bioplast~~
Alliage inconnu



Fiche de soin

LOBES

LOBE STANDARD · LOBE SUPÉRIEUR



INFORMATIONS DE CONTACT

Instagram @makabrart_piercing — réponse garantie du mardi au samedi, 10h – 18h
Tiktok @makabrart_piercing
Rendez- vous www.makabrartstudio.com
Bijoux www.antikorp.com — transmettez moi le lien du bijou souhaité via Instagram

Cicatrisation

6 sem. – 6 mois

Apparente : 6 à 8 semaines

Complète : 3 à 6 mois

Déplier pour consulter les soins

01 CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Laver les mains

Avant tout contact — aucune exception. Première source de contamination.

2. Nettoyage matin ET soir sous la douche

Savon pH neutre (savon intime ou savon bébé). Avec les doigts uniquement — jamais d'éponge, gant ou fleur de douche. Mousser autour du bijou recto-verso, rincer abondamment à l'eau tiède.

3. Sérum physiologique stérile — 1 à 2x/jour

Unidoses 0,9% NaCl. Compresse non-tissée (jamais de coton ordinaire : fibres s'accrochent).

4. Sécher par tamponnement

Compresse non-tissée ou mouchoir papier. Tamponner sans frotter. L'humidité favorise les bactéries.

5. Downsizing obligatoire — 6 à 8 semaines

Bijou initial plus long pour le gonflement. Une fois l'enflure passée, il doit être raccourci : me contacter sur Instagram.

MODE DE VIE & ALIMENTATION

Le tabac réduit l'oxygénation des tissus et rallonge fortement la cicatrisation.

L'alcool fragilise l'immunité.

Stress et manque de sommeil retardent la guérison.

Vitamine C, zinc et bonne hydratation favorisent la reconstruction tissulaire.

REPRISE DE LA VIE NORMALE

Sport léger : reprendre dès J3-J4 si pas de contact direct. Rincer au sérum physio après transpiration.

Piscine / mer : attendre cicatrisation complète (6 mois). Si exposition : rincer immédiatement.

Coiffeur : prévenir. Éviter projections de produits sur la zone.

Changement de bijou : possible à partir du downsizing (2 mois). Attention : cicatrisation superficielle ≠ complète.

BIJOUX RECOMMANDÉS POUR LE DOWNSIZING

1.2mm

Gauge (diamètre de la tige) — standard pour cette zone

Titane implant ASTM F136 uniquement

Bijou initial (pose):

-Microbarbell titane F136 1.2mm — tige longue 8-10mm

DOWNSIZING — À 2 MOIS

Types de bijoux - par placement:

-Labret 1.2mm + embout séparé

-Clicker ring titane F136 1.2mm

IMPORTANT — COMMANDE ANTIKORP

Pour les labrets: barre et embout vendus séparément. Commander la barre (catégorie Labrets Titane) + l'embout décoratif (catégorie Accessoires Titane Interne ou Threadless). Me transmettre les deux liens via Instagram.

02 À ÉVITER ABSOLUMENT

- Tourner, coulisser ou retirer le bijou

Arrache la croûte, rouvre la plaie, relance l'inflammation depuis zéro. Le bijou est immobile, toujours.

- Désinfectants en routine

Biseptine, alcool, eau oxygénée, Bétadine = irritants qui détruisent les cellules cicatricielles.

Uniquement si infection avérée.

- Éponge, gant, fleur de douche

Friction mécanique directe sur la plaie. Doigts propres exclusivement.

- Coton ordinaire au contact

Fibres qui s'accrochent. Compresse non-tissées stériles uniquement.

- Crèmes, huiles, beurres, pommades

Obstruent la plaie, créent un milieu favorable aux bactéries.

- Piscine, mer, sauna, hammam, bain prolongé

Eaux non stériles = introduction de bactéries dans une plaie ouverte.

- Taie sale — animaux au niveau de la tête

Changer la taie 1x/semaine. Animaux uniquement au pied du lit.

REJETS & MIGRATIONS — RECONNAÎTRE LES SIGNES

MIGRATION : LE BIJOU REMONTE VERS LA SURFACE, PEAU QUI S'AMINCIT ENTRE LES DEUX TROUS.

REJET : LA PEAU EXPULSE LE BIJOU, ROUGEUR DES DEUX ENTRÉES.

DANS LES DEUX CAS : ME CONTACTER IMMÉDIATEMENT SUR @MAKABRART_PIERCING. NE PAS ATTENDRE.

SIGNES D'INFECTION — QUE FAIRE

Sérosité blanche légère = lymphe = cicatrisation NORMALE

INFECTION : écoulement jaune épais + odeur + douleur intense + chaleur + rougeur étendue + fièvre.

→ Me contacter EN PREMIER sur @makabrart_piercing avant toute action

→ NE JAMAIS retirer le bijou seul : le canal se referme = abcès

